



ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ инфекции COVID-19

Привить против COVID-19 детей можно с 5 летнего возраста. Вакцинация состоит из двух доз SINOPHARM и или иного ИЛС.

Вакцинация проводится после информирования пациента (его законного представителя) об инфекции, против которой проводится прививка, название вакцины, наличии противопоказаний, закономерностях и особенностях течения поствакцинального периода и получении согласия в соответствии законодательством. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информационное согласие на вакцинацию.

Вакцинация может быть проведена после выздоровления пациента, в том числе после перенесенной COVID-19, и (или) завершения изоляции (в случае необходимости).

В настоящее время для вакцинации предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 SINOPHARM (Vero Cell), страна производитель Китайская Народная Республика.

Временные противопоказания к проведению вакцинации:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- контакт с больным COVID-19 или с подозрением на это заболевание менее, чем за 14 дней до прививки (вакцинацию проводят после 14 дней от момента контакта);
- при перенесении острой инфекции между 1 и 2 введением вакцины, второй компонент следует ввести с соблюдением интервала 21 день или, как можно быстрее, после выздоровления от острой инфекции.

После выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии вакцинацию проводят через 2-4 недели. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта - допускается проведение вакцинации после нормализации температуры.

Постоянные противопоказания к вакцинации:

- гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты;

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и т.д.) на введение компонента I вакцины;

- возраст от 0-до 5 лет (при применении инактивированной вакцины (Vero Cell)).

Перед проведением вакцинации необходимо обязательно:

- медицинский осмотр врача - специалиста: с измерением температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие и (или) наличие противопоказаний к вакцинации.

Вакцинацию проводят в два этапа:

- вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть плеча.

- на 21-28 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть плеча.

В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться в учреждении здравоохранения для предупреждения возможных аллергических реакций и поствакцинальных осложнений.

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (головная боль, усталость, миалгия, кашель, одышка, тошнота, диарея, зуд) и местные (болезненность в месте инъекции, покраснение, отек, уплотнение) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов, сыпь, зуд. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать баню (сауну), не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства (супрастин, фенкарол, лоратадин).

При повышении температуры тела после вакцинации принять нестероидные противовоспалительные средства (парацетамол, нимесулид и т.д.).

**Будьте здоровы!
Берегите себя и своих близких!**