

Вакцинация против COVID-19

– это важно!



Вакцинация против инфекции COVID-19 в районе проходит согласно «Национального плана мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022гг», приказа МЗ РБ №1044 от 08.08.2022г «О порядке проведения вакцинации против инфекции COVID-19», иных нормативных документов МЗ РБ.

Вакцинация осуществляется в прививочных кабинетах поликлиники г.Житковичи, Туровской ГБ, Ленинской СУБ и амбулаториях общей практики УЗ «Житковичская ЦРБ». Для организации максимальной доступности вакцинации против инфекции COVID-19 функционируют выездные бригады на фельдшерско-акушерские пункты, предприятия и на дом к пенсионерам и инвалидам. Основной (первичной) вакцинации против инфекции COVID-19 подлежат дети в возрасте с 5 до 18 лет и взрослые лица в возрасте 18 лет и старше.

Для специфической профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше используются векторные вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «СПУТНИК ЛАЙТ», производства РФ. Для вакцинации детей в возрасте от 5 до 18 лет, беременных и кормящих женщин используется инактивированная вакцина «SARS-CoV-2» («Vero Cell»), производства КНР.

Бустерная вакцинация против инфекции COVID-19 проводится лицам в возрасте 18 лет и старше через 6 месяцев и более, независимо каким ранее препаратом сделана основная (первичная) вакцинация или бустерная вакцинация. Она необходима для поддержания иммунитета и выработки антител.

Используются следующие вакцины:

- — «СПУТНИК ЛАЙТ» либо «Гам-КОВИД-Вак» (допускается использование компонента 1 или компонента 2 без их чередования);
- — «Vero Cell» (проводится только беременным, женщинам в период грудного вскармливания, а также людям, имеющим в анамнезе противопоказания к применению «СПУТНИК ЛАЙТ» и «Гам-КОВИД-Вак», по согласованию с пациентом);

При использовании данных вакцин с момента основной вакцинации должно пройти 6 и более месяцев.

- — Soberana Plus (производитель Институт вакцин «Финли», Республика Куба).

Данная вакцина уже поступила в УЗ «Житковичская ЦРБ». Сделать прививку кубинской вакциной можно через 4 месяца после завершения полного курса вакцинации.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение не менее 30 минут.

Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии