



Профилактика полиомиелита

Причиной полиомиелита является вирус, который поражает нервную систему. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике. Передается фекально-оральным путем. Источником инфекции чаще

всего становится пища или питьевая вода. Способствующие факторы: несоблюдение правил личной гигиены, плохие санитарные условия или недостаточный контроль за сточными водами. Вирус полиомиелита также распространяется при кашле и чихании.

Признаки и симптомы на начальной стадии:

температура, утомляемость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боль в конечностях.

Полиомиелит, в основном, поражает детей, но может также привести к параличу у подростков и взрослых, не обладающих иммунитетом.

Полиомиелит может вызвать полный паралич в течение нескольких часов, так как болезнь поражает спинной и/или головной мозг. Такой паралич может быть необратимым. В случае паралича может возникнуть неподвижность дыхательных мышц, что приводит к смерти. Специфического лечения против полиомиелита не существует.

Единственным средством предупреждения полиомиелита является вакцинация.

В Республике Беларусь иммунизация против полиомиелита введена в календарь обязательных прививок.

Вакцинация проводится инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) трехкратно в 2,3,4 месяца или комбинированной вакциной против коклюша (бесклеточный компонент), дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, вирусного гепатита, полиомиелита (АбКДС+ВГВ+ИПВ+Хиб инфекция, вакциной можно привиться на платной основе), с последующей вакцинацией в 7 лет вакциной ИПВ.

У лиц, получивших прививки, формируется иммунитет, который надежно защищает привитых от полиомиелита.

Родители, берегите здоровье ваших детей!

Государственное учреждение «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»