



**Информация  
для населения о вакцинах, которые  
используются для вакцинации на  
платной основе в Учреждении  
«Житковичская ЦРБ»**

Наименование инфекции, вакцины	Краткая информация
<p><b>Пневмококковая инфекция</b> (Превенар-13)</p>	<p>Профилактические прививки против пневмококковой инфекции рекомендуется проводить всем детям в возрасте 2-59 месяцев. Серия профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем состоит из трех доз и проводится детям <b>в возрасте 2, 4 и 12 месяцев.</b></p> <p>Дети в <b>возрасте 7-11 месяцев</b>, ранее не вакцинированные против пневмококковой инфекции, должны получить <b>две дозы с интервалом не менее 4 недель и третью дозу в течение второго года жизни не менее чем через 2 месяца после введения второй профилактической прививки.</b></p> <p>Ранее не вакцинированные дети в возрасте от 12 месяцев и старше должны получить профилактические прививки согласно Инструкции по применению вакцины.</p> <p><b>Иммунизация детей старше 2-х лет и взрослым пациентам</b> показана при наличии хронических заболеваний почек, сердца, печени и легких (вакцина вводится однократно).</p>
<p><b>Гепатит А</b> (Хаврикс)</p>	<p>Профилактические прививки против гепатита А с использованием инактивированной вакцины против гепатита А проводятся лицам <b>в возрасте 12 месяцев и старше.</b></p> <p>Полный курс вакцинации состоит из <b>двух доз с интервалом 6-12 месяцев.</b> Вакцина против гепатита А может вводиться одновременно с другими вакцинами.</p>
<p><b>Ветряная оспа</b> (Варилрикс)</p>	<p>Профилактические прививки против ветряной оспы рекомендованы лицам <b>в возрасте 12 месяцев и старше.</b> Схема вакцинации – <b>по одной дозе двукратно с интервалом не менее 6 недель.</b></p>
<p><b>Клещевой энцефалит</b> (Клещ-Э-ВАК)</p>	<p>Специфическая профилактика клещевого энцефалита для лиц от 16 лет и старше в дозе 0,5 мл и для детей от 1 года до 16 лет в дозе 0,25 мл.</p>

	<p><b>Первичный курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций</b> по 1 дозе с интервалом 1-7 мес. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в эпидсезон.</p> <p><b>Первую ревакцинацию</b> проводят однократно через 1 год после завершения первичного курса вакцинации дозой 0,5 мл для лиц от 16 лет и старше и дозой 0,25 мл для детей от 1 года до 16 лет. <b>Последующие отдаленные ревакцинации</b> проводят каждые три года однократно в возрастной дозировке.</p>
<p><b>Папилломавирусная инфекция</b> (Церварикс)</p>	<p>Профилактические прививки против папилломавирусной инфекции рекомендуется проводить девочкам-подросткам с <b>9 лет и молодым женщинам до 25 лет</b>. Курс иммунизации состоит из <b>трех профилактических прививок</b>.</p>
<p><b>Ротавирусная инфекция</b> (Рота-В-Эйд – живая пероральная пентавалентная вакцина)</p>	<p>Вакцинацию против ротавирусной инфекции рекомендуется проводить детям в <b>возрасте 6-32 недель</b>. Курс состоит из <b>применения трех доз препарата с интервалом не менее 4-х недель</b>. Предназначена только для детей и только для приема внутрь.</p>
<p><b>Менингококковая инфекция</b> (Менактра)</p>	<p>Вакцина против менингококковой инфекции предназначена для использования у лиц в <b>возрасте от 9 месяцев до 55 лет</b>. Первичная вакцинация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дети в возрасте <b>от 9 до 23 месяцев: две инъекции</b> по 1 дозе с интервалом 3 месяца.</li> <li>• Лица в возрасте <b>от 2 до 55 лет: одна доза вакцины вводится однократно</b>.</li> </ul>
<p><b>Дифтерия, столбняк, коклюш</b> (Адасель)</p>	<p>Вакцина предназначена для вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка у <b>детей с 4-х лет и взрослых</b>.</p>
<p><b>Против дифтерии, столбняка, коклюша полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита «В»</b> «Гексаксим»</p>	<p>Вакцина предназначена для вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита «В» для детей с <b>2 месяцев, курс иммунизации состоит из трех профилактических прививок с интервалом не менее 4 недель</b>.</p>



*Государственное учреждение*  
*«Житковичский районный центр*  
*гигиены и эпидемиологии»*